



Foglio illustrativo n. 6949 / 2020

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	EW emulsione, olio in acqua
Tenore di principi attivi:	25.5 % Spiroxamina (250 g/l); 13.6 % Tebuconazolo (133 g/l)
Denominazione IUPAC:	8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-ylmethyl(ethyl)(propyl)amine; (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Pronto Plus

Numero di omologazione federale: A-5304	Paese di provenienza: Austria
Numero di omologazione estero: 2628-0	Titolare dell'autorizzazione estera: Bayer Austria GmbH Geschäftsbereich für Pflanzenschutz, Austria

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Frumento	Fusariosi della spiga	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 55 - 69 (BBCH).	1, 2, 3, 4
Frumento	Oidio dei cereali, Ruggine bruna, Septoriosi della spiga (S. nodorum), Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).	2, 3, 4, 5
Frumento, Triticale	Ruggine gialla	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).	2, 3, 4, 5
Orzo	Macchie reticolate dell'orzo, Oidio dei cereali, Rincosporiosi, Ruggine nana dell'orzo	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 31-51 (BBCH).	2, 3, 4, 5
Segale	Ruggine bruna	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	2, 3, 4, 5, 6
Triticale	Oidio dei cereali, Rincosporiosi, Ruggine bruna, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).	2, 3, 4, 5
Triticale	Fusariosi della spiga	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: Stadi 55 - 69 (BBCH).	1, 2, 3, 4

Oneri generali / agronomici:

- 1 SPe 3: Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG.
- 2 Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- 4 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 5 SPe 3: Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG.
- 6 Trattamento in colture seminate in autunno.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera.
Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.
I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**Frase PF**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.