



Foglio illustrativo n. 8351 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Erbicida
Formulazione: SL concentrato solubile in acqua
Tenore di principi attivi: 29.1 % MCPA (340 g/l)
Denominazione IUPAC: : (4-chloro-2-methylphenoxy)acetic acid; 3,6-dichloro-o-anisic acid

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Banvel M

Numero di omologazione federale: D-2314 Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 0023-00 Titolare dell'autorizzazione estera: Syngenta Agro GmbH, Germania

Gabi Rasenunkraut-Vernichter

Numero di omologazione federale: D-2320 Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 0023-62 Titolare dell'autorizzazione estera: GABI-Biochemie Hüdersen, Rhodovi KG, Germania

Compo Rasenunkraut-Vernichter Banvel M

Numero di omologazione federale: D-2317 Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 0023-77 Titolare dell'autorizzazione estera: Syngenta Agro GmbH, Germania

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Prati e pascoli	Specie di romice	Concentrazione: 0.5 - 1 % Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Trattamento pianta per pianta con vaporizzatore a zaino.	1, 2
Prati e pascoli	Specie di romice	Concentrazione: 10 - 30 % Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Lotta pianta per pianta con un apparecchio umettante.	1, 2

Coltivazione piante ornam.

Tappeti erbosi e terreni sportivi

Dicotiledoni (malerbe)
Efficacia parziale:
Bugola, Ellera terrestre comune, Varietà annuali di veronica, Veronica a foglie di serpillo, Veronica comune

Dosaggio: 4 l/ha
Applicazione: Irrigare o annaffiare.

3, 4, 5

Oneri generali / agronomici:

- 2 Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il termine di attesa è di 2 settimane.
- 3 Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.
- 5 Non utilizzare l'anno della semina.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione.
- 4 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frafi PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.