



Foglio illustrativo n. 6982 / 2022

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	WP polvere bagnabile
Tenore di principi attivi:	50 % Flumiossazina
Denominazione IUPAC:	7-fluoro-6-[(3,4,5,6-tetrahydro)phtalimido]-4-(2-propynyl)-1,4-benzoxazion-3(2H)-one

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Pledge

Numero di omologazione federale: F-6103	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 9400280	Titolare dell'autorizzazione estera: Philagro France, Francia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Viticultura			
Vite in produzione	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe). Efficacia parziale: Saeppola canadese	Dosaggio: 0.8 - 1 kg/ha Applicazione: Prima dell'emergenza delle malerbe. , In primavera.	1, 2, 3
Orticoltura			
Asparagi [bianco]	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.8 - 1 kg/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: In pre-emergenza.	1, 2, 4
Asparagi [verde]	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.8 - 1 kg/ha Termine d'attesa: 4 Settimane Applicazione: In pre-emergenza.	1, 2, 4
Rabarbaro	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1 kg/ha Applicazione: Dopo il raccolto.	1, 2, 5
Campicoltura			
Frumento autunnale	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 60 g/ha Applicazione: Autunno: in pre-emergenza - post-emergenza precoce; in primavera: fino allo stadio 29 (BBCH).	1, 6

Oneri generali / agronomici:

- 2 L'utente deve essere accuratamente informato sui rischi di danni. Occorre indicare le possibilità di prevenzione.
- 3 Dal 4° anno di coltura.
- 4 Dal 3° anno di coltura.
- 5 Il trattamento erbicida non deve interessare la coltura. Richiesta una schermatura.
- 6 Al massimo un 1 trattamento per coltura.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**Frase PF**

- | | |
|-------|---|
| | Tenere fuori dalla portata dei bambini. |
| SP 1 | Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. |
| SPo 2 | Lavare tutto l'abbigliamento di protezione dopo l'impiego. |