



Foglio illustrativo n. 7114 / 2023

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Erbicida
Formulazione: EC concentrato emulsionato
Tenore di principi attivi: 2.57 % Pyraflufen-etile (26.5 g/l)
Denominazione IUPAC: ethyl 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxyacetate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Quickdown

Numero di omologazione federale: D-7291
Numero di omologazione estero: 005693-00
Paese di provenienza: Germania
Titolare dell'autorizzazione estera: Nichino Europ Co LTD, Inghilterra

Sorcier

Numero di omologazione federale: F-6061
Numero di omologazione estero: 2110101
Paese di provenienza: Francia
Titolare dell'autorizzazione estera: Philagro France, Francia

Evolution

Numero di omologazione federale: I-6062
Numero di omologazione estero: 015071
Paese di provenienza: Italia
Titolare dell'autorizzazione estera: Sipcam Italia S.P.A., Italia

Piramax EC

Numero di omologazione federale: I-6060
Numero di omologazione estero: 015062
Paese di provenienza: Italia
Titolare dell'autorizzazione estera: Certis Belchim B.V., Paesi Bassi

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Frutticoltura			
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo	Eliminazione dei ricacci	Concentrazione: 0.2 % Applicazione: Dal 3° anno.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Viticultura			
Vite	Eliminazione dei ricacci	Concentrazione: 0.2 % Applicazione: Dal 3° anno.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Campicoltura

Patate	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 0.4 l/ha Applicazione: Dopo l'emergenza delle malerbe., In pre-emergenza e in post-emergenza, al più tardi fino all'emergenza di 5% delle patate.	1, 5, 9, 10, 11
Patate da tavola e da foraggio	Disseccamento, essiccamento	Dosaggio: 1.6 l/ha Applicazione: Patate senza distruzione del frascame.	1, 4, 6, 7, 12, 13
Patate da tavola e da foraggio	Disseccamento, essiccamento	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Alla trinciatura del frascame delle patate.	1, 4, 6, 7, 13, 14
Patate per la produzione di tuber- seme	Disseccamento, essiccamento	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Alla trinciatura del frascame delle patate.	1, 4, 6, 7, 13, 15

Oneri generali / agronomici:

- 4 SPE 3: Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 3 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.
- 5 Miscela estemporanea con prodotti umidificanti e adesivanti conformemente alle indicazioni del titolare del permesso.
- 6 SPE 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 7 SPE 3: per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 8 Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.
- 9 SPE 3: Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.
- 10 SPE 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 11 SPE 3: per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 12 Trattamto frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato).
- 13 Aggiungere per ciascuno 2 l/ha di olio con additivi, p.es. olio minerale.
- 14 Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- 15 Al massimo 2 trattamenti per coltura.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera.
- 2 Non trattare con vaporizzatore o vaporizzatore a zaino.
- 3 Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frasi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.