



Foglio illustrativo n. 8165 / 2026

Per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 47 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) del 20 agosto 2025 (RS 916.161)

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	SP polvere solubile in acqua
Tenore di principi attivi:	98.99% Idrogencarbonato die potassio
Denominazione IUPAC:	Potassium hydrogen carbonate; Potassium bicarbonate; Carbonic acid, monopotassium salt

Stoccaggio

Il prodotto deve essere stoccato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici, in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate. I contenitori aperti che non sono stati consumati completamente devono essere richiusi.

Smaltimento

Contenitori:	Consegnare i contenitori vuoti al servizio di raccolta dei rifiuti.
Residui di prodotto:	Per lo smaltimento, portare i residui del prodotto al centro di raccolta comunale, al centro di raccolta per i rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Imballaggio ed etichettatura

Per l'immissione sul mercato in Svizzera il prodotto fitosanitario deve essere lasciato nell'imballaggio originale e l'etichetta apposta all'estero deve rimanere visibile sull'imballaggio (cfr. art. 69 cpv. 3 e art. 72 cpv. 3 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF).

Si applicano la classificazione e l'etichettatura dell'etichetta originale estera.

L'imballaggio deve inoltre recare le indicazioni di cui all'articolo 72 capoverso 1 lettere a–c. Le indicazioni sui possibili usi del prodotto fitosanitario e le condizioni connesse a tale uso sono quelle del prodotto di riferimento omologato in Svizzera (cfr. art. 47 cpv. 2). Le istruzioni allegate all'imballaggio rilasciate dal Servizio di omologazione possono essere utilizzate per l'etichettatura (cfr. art. 52 OPF). Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui prodotti chimici e sulla protezione dell'ambiente.

Prodotti commerciali

VitiSan

Numero di omologazione federale: A-7215

Numero di omologazione estero: 3578-1

Paese di provenienza: Austria

Titolare dell'autorizzazione estera: STAR Agro Handels GmbH

VitiSan

Numero di omologazione federale: D-7214

Numero di omologazione estero: 027593-00

Paese di provenienza: Germania

Titolare dell'autorizzazione estera: Biofa AG

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragola	Oidio della fragola	Concentrazione: 0,5%. Dosaggio: 5 kg/ha. Termine d'attesa: 3 Giorni.	1
Mirtillo	Oidio dei mirtilli	Dosaggio: 5 kg/ha. Termine d'attesa: 0 Giorni. Applicazione: Stadi 60-85 (BBCH).	2,7,13,14
Specie di ribes	Oidio delle varietà di ribes	Concentrazione: 0,5%. Dosaggio: 5 kg/ha. Termine d'attesa: 0 Giorni. Applicazione: Stadi 60-85 (BBCH).	2,7,13,14
Specie di rubus	Oidio delle varietà di rubus	Concentrazione: 0,5%. Dosaggio: 5 kg/ha. Termine d'attesa: 0 Giorni. Applicazione: Stadi 60-85 (BBCH).	2,4,7,10,13
Coltivazione piante ornam.			
Primule, Ciclamino, Crisantemo, Gerbera, Begonia, Zucca ornamentale	Oidio (diverse specie) su piante ornamentali	Dosaggio: 3 kg/ha. Applicazione: In caso di rischio d'infestazione.	2,6,12
Frutticoltura			
Frutta a granelli	Oidio della mela/pera	Concentrazione: 0,31%. Dosaggio: 5 kg/ha. Termine d'attesa: 8 Giorni. Applicazione: Dal germogliamento.	11,15
Frutta a nocciolo	Monilia dei rami e dei fiori	Concentrazione: 0,31%. Dosaggio: 5 kg/ha. Applicazione: Durante la fioritura.	11,15
Pero / Nashi, Melo	Macchie nere delle mele e delle pere; Ticchiolatura della frutta a granelli	Concentrazione: 0,31%. Dosaggio: 5 kg/ha. Termine d'attesa: 8 Giorni. Applicazione: Dal germogliamento.	11,15

Orticoltura

Alchechengio, Peperone, Melanzana	Oidio delle solanceae	Dosaggio: 5 kg/ha. Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco.	2,5,8
Cipollotti a mazzi, Cipolle dolci	Botrytis spp.	Dosaggio: 5 kg/ha. Termine d'attesa: 1 Giorni. Applicazione: In caso di rischio d'infestazione.	2,5,13
Erbette da cucina	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Dosaggio: 5 kg/ha. Applicazione: In caso di rischio d'infestazione.	2,5,13
Fave, Piselli con baccello, Lenticchia	Oidio del pisello	Dosaggio: 5 kg/ha. Termine d'attesa: 0 Giorni.	2,5,8
Indivia	Oidio delle Asteracee	Dosaggio: 3 kg/ha. Termine d'attesa: 1 Giorni. Applicazione: In caso di rischio d'infestazione.	2,9
Zucche (buccia non commestibile), Zucche con buccia commestibile, Meloni, Angurie, Zucca da olio	Oidio delle Cucurbitacee	Dosaggio: 5 kg/ha. Termine d'attesa: 3 Giorni. Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco.	2,5,8

Viticoltura

Vite	Oidio della vite	Concentrazione: 0,31%. Dosaggio: 5 kg/ha. Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto.	3
------	------------------	---	---

Oneri

- 1 La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 2 Autorizzato come uso minore.
- 3 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 4 Per le more la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 5 Al massimo 6 trattamenti per coltura.
- 6 Intervalli di 5 - 7 giorni tra i trattamenti.
- 7 Al massimo 6 trattamenti per particella e anno.
- 8 Trattamenti a intervalli di almeno 3 giorni.
- 9 Al massimo 10 trattamenti per coltura con un intervallo di 5 - 7 giorni.
- 10 Per i lamponi estivi la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. Per i lamponi autunnali la dose si riferisce ad una siepe di 150 - 170 cm d'altezza, trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.

- 11 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
 - 12 Al massimo 10 trattamenti.
 - 13 Trattamenti a intervalli di almeno 5 giorni.
 - 14 La dose indicata si riferisce allo stadio "allegagione (50 - 90% delle infiorescenze hanno frutti visibili)", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
 - 15 Soltanto in combinazione con 0.2% (3.2 kg/ha) di zolfo umidificante 80%.
-

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.