



Foglio illustrativo n. 7422 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	SE sospensione-emulsione
Tenore di principi attivi:	10.1 % Fluroxypyr (100 g/l) [pari a Fluroxypyr-meptil (144.1 g/L; 14.5%)]; 0.25 % Florasulam (2.5 g/l)
Denominazione IUPAC:	4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid; 2,6,8-trifluoro-5-methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonilide

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Avena, Frumento, Orzo	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 1 - 1.5 l/ha Applicazione: Primavera, in post-emergenza (BBCH 13 - 29).	1, 2, 3, 4
Avena, Frumento, Orzo, Segale, Triticale	Caglio asprello, Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)	Dosaggio: 1 - 1.8 l/ha Applicazione: Primavera, in post-emergenza (BBCH 13 - 39).	1, 3, 4, 5

Oneri generali / agronomici:

- 2 Trattamento in colture seminate in primavera.
- 3 SPe 3: per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 4 Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- 5 Trattamento in colture seminate in autunno.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.