Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Settore Protezione sostenibile dei vegetali

Foglio illustrativo n. 8908 / 2020

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Acaricida, Fungicida
Formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi:	80 % Zolfo
Denominazione IUPAC:	sulfur

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Microthiol Special Disperss

Numero di omologazione federale: F-6498	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 9800245	Titolare dell'autorizzazione estera: UPL -United Phosphorous Ltd.,Regno Unito

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragola	Oidio della fragola	Concentrazione: 0.2 - 0.4 % Dosaggio: 2 - 4 kg/ha	1, 2, 3
Frutticoltura			
Frutta a granelli	Oidio della mela/pera Efficacia parziale: Ticchiolatura della frutta a granelli Effetti secondari: Eriofidi rugginosi	Concentrazione: 0.75 % Dosaggio: 12 kg/ha Applicazione: Al germogliamento.	2, 4
Frutta a granelli	Oidio della mela/pera Efficacia parziale: Ticchiolatura della frutta a granelli Effetti secondari: Eriofidi rugginosi	Concentrazione: 0.5 - 0.75 % Dosaggio: 8 - 12 kg/ha Applicazione: Prima della fioritura.	2, 4
Frutta a granelli	Oidio della mela/pera Efficacia parziale: Ticchiolatura della frutta a granelli Effetti secondari: Eriofidi rugginosi	Concentrazione: 0.3 - 0.5 % Dosaggio: 4.8 - 8 kg/ha Applicazione: Dopo la fioritura.	2, 4, 5

Pero / Nashi	Eriofidi gallicoli	Concentrazione: 2 % Dosaggio: 32 kg/ha Applicazione: Dopo il raccolto.	2, 4
Pesco/pesco noce	Oidio della pesca, Ticchiolatura del pesco	Concentrazione: 0.3 - 0.5 % Dosaggio: 4.8 - 8 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Dopo la fioritura.	2, 4
Viticoltura			
Vite	Oidio della vite	Concentrazione: 0.1 - 0.4 % Dosaggio: 1.6 - 6.4 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto.	2, 6, 7, 8
Vite	Acariosi della vite, Eriofide della vite	Concentrazione: 2 % Dosaggio: 16 kg/ha Applicazione: Irrorazione al germogliamento.	2, 9
Orticoltura			
Cucurbitacee	Oidio delle Cucurbitacee	Concentrazione: 0.1 - 0.2 % Dosaggio: 1 - 2 kg/ha Termine d'attesa: 3 Giorni	2

Oneri generali / agronomichi:

1 Nessun trattamento tra la fioritura e fino alle fine del raccolto.

3 La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni dell'UFAG.

4 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni dell'UFAG.

5 Trattamenti dopo la fioritura unicamente su varietà che tollerano lo zolfo.

6 Dose più elevata in caso di forte attacco.

7 Anche per applicazione per via aerea.

8 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni dell'UFAG.

9 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 15-51 (F), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 800 l/ha (base per il calcolo).

Oneri per la protezzione dell'utilizzatore:

2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frasi PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.