Foglio illustrativo n. 7870 / 2025

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Insetticida
Formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi:	Bacillus thuringiensis var. kurstaki [Preparato di spore, 32'000 UI/mg; Ceppo SA-11]
Denominazione IUPAC:	Bacillus thuringiensis var. kurstaki

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Delfin

Numero di omologazione federale: F-6718 — Paese di provenienza: Francia

Numero di omologazione estero: 9200482 — Titolare dell'autorizzazione estera: Certis Europe BV,Francia

Delfin jardin

Numero di omologazione federale: F-6720 — Paese di provenienza: Francia

Numero di omologazione estero: 2030175 — Titolare dell'autorizzazione estera: Certis Europe BV,Francia

Wasco WG

Numero di omologazione federale: F-6719 — Paese di provenienza: Francia

Numero di omologazione estero: 9200482 — Titolare dell'autorizzazione estera: Certis Europe BV,Francia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Mirtillo	Falene, Nottue (defogliatrici)	Concentrazione: 0.075 % Dosaggio: 0.75 kg/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: Stadi 53-89 (BBCH).	1, 2, 3, 4, 5
Specie di ribes	Falene	Concentrazione: 0.075 % Dosaggio: 0.75 kg/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: Stadi 53-89 (BBCH).	1, 2, 3, 4, 5
Specie di rubus	Falene	Concentrazione: 0.075 % Dosaggio: 0.75 kg/ha Applicazione: Stadi 53-89 (BBCH).	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna
tel. +41 58 462 85 16
psm@blv.admin.ch
www.blv.admin.ch

Frutticoltura

Ciliegio, Melo, Prugno/Susino	Tignole	Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.8 kg/ha Applicazione: Prefioritura o postfioritura.	3, 10
Frutta a granelli	Tortrici ricamatrici	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1.6 kg/ha Applicazione: "Prefioritura o postfioritura" o "in estate".	3, 10
Frutta a granelli, Frutta a nocciolo, Frutta con guscio	Falene	Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.8 kg/ha Applicazione: Prefioritura o postfioritura.	3, 10
Frutta a nocciolo	Tortrici ricamatrici	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1.6 kg/ha Applicazione: "Prefioritura o postfioritura" o "in estate".	3, 10

Viticoltura

Vite	Tignole della vite (Eupoecilia ambiguella, Lobesia botrana)	Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.6 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	3, 11, 12, 13

Orticoltura

Angurie, Cetrioli, Meloni, Zucche (buccia non commestibile), Zucche con buccia commestibile	Larve defogliatrici	Dosaggio: 1 kg/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: Stadi 12-89 (BBCH).	1, 3, 5, 14
Indivia e cicoria da foglia, Insalate a foglie (Asteracee)	Larve defogliatrici	Dosaggio: 0.75 kg/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: Stadi 12-89 (BBCH).	1, 3, 5, 14
Pieno campo: Carciofi	Larve defogliatrici	Dosaggio: 0.6 kg/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: Stadi 12-89 (BBCH).	1, 3, 5, 14
Pieno campo: Mais dolce	Larve defogliatrici	Dosaggio: 1.5 kg/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: Stadi 12-89 (BBCH).	1, 3, 5, 14
Pieno campo: Porro	Tignola del porro	Dosaggio: 1 kg/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: Stadi 12-89 (BBCH).	1, 3, 5, 14
Pieno campo: Specie di cavoli	Nottue (defogliatrici)	Dosaggio: 0.6 kg/ha Termine d'attesa: 1 Settimane	3
Serra: Alchechengio, Melanzana, Peperone, Pepino, Pomodori	Tuta absoluta	Concentrazione: 0.125 % Termine d'attesa: 3 Giorni	3
Serra: Specie di cavoli	Nottue (defogliatrici)	Dosaggio: 0.6 kg/ha Termine d'attesa: 3 Giorni	3
Specie di cavoli	Cavolaie, Tignola delle Crocifere	Dosaggio: 0.5 kg/ha Termine d'attesa: 1 Settimane	3
Spinaci	Larve defogliatrici	Dosaggio: 0.75 kg/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: Stadi 12-89 (BBCH).	1, 3, 5, 14

Campicoltura

Canapa	Nottue (defogliatrici)	Dosaggio: 1 kg/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: Stadi 12-89 (BBCH).	1, 3, 14
Tabacco	Nottue (defogliatrici)	Dosaggio: 1 kg/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: Stadi 12-89 (BBCH).	1, 3, 5, 14

Coltivazione piante ornam.

Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	Falene, Limantridi, Tignole	Concentrazione: 0.1 %	3
Begonia, Gerbera, Primule	Falene, Nottue (defogliatrici), Tignole	Concentrazione: 0.075 % Applicazione: Stadi 12-89 (BBCH).	1, 3, 5, 14
Bosso (Buxus)	Piralide del bosso	Concentrazione: 0.15 %	3, 5, 8
Zucca ornamentale	Falene, Nottue (defogliatrici), Tignole	Dosaggio: 0.75 kg/ha Applicazione: Stadi 12-89 (BBCH).	1, 3, 5, 14

Selvicoltura

Selvicoltura in generale	Limantridi, Taumatopea	Concentrazione: 0.1 - 0.2 %	3

Oneri generali / agronomici:

1 Trattamenti ad un intervallo di 7 - 10 giorni.

2 La dose indicata si riferisce allo stadio "allegagione (50 - 90% delle infiorescenze hanno frutti visibili)", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.

3 Non utilizzare in caso di temperature fredde.

4 Al massimo 6 trattamenti per particella e anno.

5 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).

6 Per i lamponi estivi la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. Per i lamponi autunnali la dose si riferisce ad una siepe di 150 - 170 cm d'altezza, trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.

7 Trattamenti a intervalli di 7 giorni.

8 Trattamento ad inizio infestazione.

9 Per le more la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.

10 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.

11 Contro la seconda generazione delle tignole della vite.

12 Aggiungere 1% di zucchero.

13 La dose indicata si riferisce ad un trattamento nella zona dei grappoli con una quantità standard di poltiglia di 1200 l/ha (base per il calcolo).

14 Al massimo 6 trattamenti per coltura.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:
Frasi PF

Non respirare i aerosoli.

Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

Evitare il contatto con la pelle.

Autorizzato per l'utilizzazione non professionale.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle.

SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.