



Foglio illustrativo n. 8373 / 2021

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Prodotto per la concia delle sementi
Formulazione:	FS concentrato multifase per trattamento sementi o soluzione in sospensione
Tenore di principi attivi:	3.94 % Pyrimethanil (42 g/l); 3.62 % Prochloraz (38.6 g/l) [sotto forma di complesso prochloraz-rame [3.94%]]; 2.35 % Triticonazolo (25 g/l)
Denominazione IUPAC:	N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)aniline; N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide; (+/-)-(E)-5+(4-chlorobenzylidene)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-methyl)cyclopentanol

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Rubin TT

Numero di omologazione federale: D-6668	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 005907-00	Titolare dell'autorizzazione estera: BASF SE, Germania

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Avena	Carbone nudo dell'avena	Dosaggio: 150 ml/100 kg di sementi	1, 2, 3
Frumento	Carbone del grano, Carie, Muffa delle nevi, Septoriosi delle piantule (S. nodorum)	Dosaggio: 200 ml/100 kg di sementi	1, 2, 3
Orzo autunnale	Carbone coperto dell'orzo, Carbone nudo dell'orzo, Muffa delle nevi, Septoriosi delle piantule (S. nodorum), Striatura bruna dell'orzo	Dosaggio: 250 ml/100 kg di sementi	1, 2, 3
Orzo primaverile	Carbone coperto dell'orzo, Carbone nudo dell'orzo, Macchie reticolate dell'orzo, Striatura bruna dell'orzo	Dosaggio: 200 ml/100 kg di sementi	1, 2, 3
Segale autunnale, Triticale	Muffa delle nevi	Dosaggio: 150 ml/100 kg di sementi	1, 2, 3
Spelta	Carie, Muffa delle nevi, Septoriosi delle piantule (S. nodorum)	Dosaggio: 200 ml/100 kg di sementi	1, 2, 3

Oneri generali / agronomici:

- 3 I sacchi contenenti sementi conciate devono essere designati con la seguente iscrizione sull'etichetta:
- Sementi conciate. Non ingerire! I residui non devono essere usati come foraggio o alimento, neanche se lavati.
 - La denominazione commerciale, il(i) principio(i) attivo(i) e le frasi tipo per precauzioni da prendere del prodotto per la concia delle sementi.
 - Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici le sementi conciate deve essere interamente incorporate nel terreno; assicurarsi che le sementi siano completamente incorporate all'estremità dei solchi.
 - Per proteggere uccelli e mammiferi selvatici, eliminare le sementi trattate sparse.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Le etichette dei sacchi contenenti sementi conciate devono recare le seguenti indicazioni: "Nell'aprire i sacchi di sementi e nel caricare la seminatrice è necessario indossare guanti di protezione. Evitare la formazione e l'inalazione di polvere."
- 2 Nel processo di concia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante il processo di concia, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. sistemi chiusi), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**Frafi PF**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.