



Foglio illustrativo n. 8689 / 2023

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	EC concentrato emulsionato
Tenore di principi attivi:	14.9 % Protioconazolo (150 g/l); 7.43 % benzovindiflupyr (75 g/l)
Denominazione IUPAC:	(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione; N-[(1RS,4SR)-9-(dichloromethylene)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Elatus Era

Numero di omologazione federale: D-7377	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 008406-00	Titolare dell'autorizzazione estera: Syngenta Agro GmbH, Germania

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Frumento	Oidio dei cereali, Ruggine bruna, Ruggine gialla, Septoriosi della spiga (S. nodorum), Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).	1, 2, 3
Frumento	Fusariosi della spiga	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 55 - 69 (BBCH).	1, 2, 3
Orzo	Bruciature fogliari (PLS + RCC), Macchie reticolate dell'orzo, Oidio dei cereali, Rincosporiosi, Ruggine nana dell'orzo	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 31-51 (BBCH).	1, 2, 3
Spelta	Oidio dei cereali, Ruggine bruna, Ruggine gialla, Septoriosi della spiga (S. nodorum), Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).	1, 2, 3
Spelta	Fusariosi della spiga	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 55 - 69 (BBCH).	1, 2, 3
Triticale	Oidio dei cereali, Rincosporiosi, Ruggine bruna, Ruggine gialla, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).	1, 2, 3

Oneri generali / agronomici:

- 1 SPe 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 3 SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per coltura con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC numero 07 (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHI).

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**Frase PF**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.