



Foglio illustrativo n. 7901 / 2023

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi:	41.7 % Fluopyram (500 g/l)
Denominazione IUPAC:	N-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]ethyl}-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluamide

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Luna Privilege

Numero di omologazione federale: I-5660	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 14806	Titolare dell'autorizzazione estera: Bayer S.p.A., Italia

Luna Privilege

Numero di omologazione federale: F-7336	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 2130200	Titolare dell'autorizzazione estera: Bayer SAS, Francia

Luna Privilege

Numero di omologazione federale: B-6880	Paese di provenienza: Belgio
Numero di omologazione estero: 10252P/B	Titolare dell'autorizzazione estera: Bayer CropScience N.V., Belgio

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragola	Marciume grigio (Botrytis cinerea), Oidio della fragola, Vaioletura rossa della fragola	Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane	1, 2, 3
Frutticoltura			
Ciliegio	Antracnosi del ciliegio, Monilia dei frutti	Concentrazione: 0.0175 % Dosaggio: 0.28 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: Stadi 71-85 (BBCH).	1, 4, 5, 6
Frutta a granello	Malattie da stoccaggio [Lenticellosi, muffa (Monilia), marciume grigio, muffa verde]	Concentrazione: 0.02 % Dosaggio: 0.32 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: Stadi 76-89 (BBCH).	1, 4, 7, 8

Frutta a granello	Oidio della mela/pera	Concentrazione: 0.01 % Dosaggio: 0.16 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Stadi 55-85 (BBCH).	1, 4, 8
Frutta a granello	Ticchiolatura della frutta a granello	Concentrazione: 0.01 % Dosaggio: 0.16 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Stadi 55-85 (BBCH).	1, 4, 8, 9
Frutta a nocciolo	Monilia dei frutti	Concentrazione: 0.025 % Dosaggio: 0.4 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: Stadi 71-85 (BBCH).	1, 4, 10
Prugno/Susino	Monilia dei frutti	Concentrazione: 0.0175 % Dosaggio: 0.28 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Stadi 71-85 (BBCH).	1, 4, 5, 6
Orticoltura			
Cima di rapa, Crescione, Rucola, Valerianella	Mal dello sclerozio, Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Stadi 20-43 (BBCH).	1, 11, 12
Pieno campo: Fagioli, Piselli	Mal dello sclerozio, Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 7 Giorni Applicazione: Dall'inizio della fioritura fino alla piena fioritura.	1, 11
Pieno campo: Insalate (Asteracee)	Mal dello sclerozio, Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 10 Giorni Applicazione: Stadi 40-49 (BBCH).	1, 11
Serra: Cetrioli	Oidio delle Cucurbitacee	Concentrazione: 0.015 % Termine d'attesa: 3 Giorni	1, 13
Serra: Cetrioli, Pomodori	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.05 % Termine d'attesa: 3 Giorni	1, 11
Serra: Insalate del genere Lactuca	Mal dello sclerozio, Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 21 Giorni Applicazione: Stadi 20-43 (BBCH).	1, 11
Serra: Melanzana	Oidio delle solanacee	Concentrazione: 0.015 % Termine d'attesa: 7 Giorni	1, 11
Serra: Melanzana	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.05 % Termine d'attesa: 7 Giorni	1, 11
Serra: Patisson, Rondini, Zucchine	Cancro gommoso, Oidio delle Cucurbitacee	Dosaggio: 0.4 l/ha Termine d'attesa: 3 Giorni	1, 11, 12, 14, 15
Serra: Pomodori	Oidio del pomodoro	Concentrazione: 0.015 % Termine d'attesa: 3 Giorni	1, 13
Campicoltura			
Lino	Mal dello sclerozio, Marciume grigio (Botrytis cinerea), Oidio del lino	Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Stadio 12-49 (BBCH).	1, 11, 12
Pisello proteico	Mal dello sclerozio, Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Dosaggio: 0.5 l/ha Applicazione: Dall'inizio della fioritura fino alla piena fioritura.	1, 11
Coltivazione piante ornam.			
Gladiolo	Stromatinia gladioli	Dosaggio: 0.7 l/ha Applicazione: Alla piantagione.	1, 16, 17
Gladiolo	Stromatinia gladioli	Concentrazione: 0.175 % Applicazione: Alla piantagione.	1, 16, 18, 19
Pieno campo: Colture da fiore e piante verdi	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.05 % Applicazione: Stadio 20-65 (BBCH)	1, 8, 15, 20, 21
Serra: Colture da fiore e piante verdi, Rose	Oidio (diverse specie) su piante ornamentali	Concentrazione: 0.05 %	1, 8, 20, 22
Serra: Colture da fiore e piante verdi, Rose	Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.05 % Applicazione: Stadio 12-65 (BBCH)	1, 8, 15, 20, 21

Oneri generali / agronomici:

- Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.
- La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenze, effettuare al massimo 3 trattamenti per anno e particella con prodotti contenenti principi attivi del gruppo dei SDHI e dei QoI.
- Soltanto in combinazione con 0.0175% di Flint.
- L'intervallo tra due applicazioni successive deve essere almeno di 14 giorni.

- 8 SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenze, effettuare al massimo 3 trattamenti per anno e particella con prodotti contenenti principi attivi del gruppo dei SDHI.
- 9 Soltanto in combinazione con 0.03% Delan WG o 0.1% Captan (80%).
- 10 SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenze, effettuare al massimo 2 trattamenti per anno e particella con prodotti contenenti principi attivi del gruppo dei SDHI.
- 11 Al massimo 2 trattamenti per coltura.
- 12 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
- 13 Al massimo 4 trattamenti per coltura.
- 14 Per motivi di potenziale fitotossicità applicare solo dal 1° maggio al 1° ottobre.
- 15 Trattamenti a intervalli di almeno 7 giorni.
- 16 Trattamento del solco.
- 17 In 200 - 400 l di acqua/ha.
- 18 Quantitativo di poltiglia: 4 l/a.
- 19 Trattamento con vaporizzatore a zaino.
- 20 In colture o varietà sensibili può provocare danni legati ad un'eventuale fitotossicità: effettuare un trattamento di prova prima del trattamento generale.
- 21 Al massimo 2 trattamenti per anno.
- 22 Quantitativo di poltiglia: 500 - 1000 l/ha.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.