



Foglio illustrativo n. 7328 / 2021

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	EC concentrato emulsionato
Tenore di principi attivi:	23.3 % Triclopir (240 g/l); 5.83 % Clopiralid (60 g/l)
Denominazione IUPAC:	3,5,6-trichloro-2-pyridyloxyacetic acid; 3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Ronx

Numero di omologazione federale: F-6702

Numero di omologazione estero: 8100006

Paese di provenienza: Francia

Titolare dell'autorizzazione estera: Corteva Agriscience France S.A.S,Francia

Garlon L60

Numero di omologazione federale: F-6698

Numero di omologazione estero: 8100006

Paese di provenienza: Francia

Titolare dell'autorizzazione estera: Corteva Agriscience France S.A.S,Francia

Spicanet EV

Numero di omologazione federale: F-6699

Numero di omologazione estero: 8100006

Paese di provenienza: Francia

Titolare dell'autorizzazione estera: Corteva Agriscience France S.A.S,Francia

Garlon Pro

Numero di omologazione federale: F-6700

Numero di omologazione estero: 8100006

Paese di provenienza: Francia

Titolare dell'autorizzazione estera: Corteva Agriscience France S.A.S,Francia

Semille

Numero di omologazione federale: F-6701

Numero di omologazione estero: 8100006

Paese di provenienza: Francia

Titolare dell'autorizzazione estera: Corteva Agriscience France S.A.S,Francia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Prati e pascoli	Specie di romice	Concentrazione: 0.5 - 1 % Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2, 3, 4
Prati e pascoli	Cardi perenni	Concentrazione: 0.25 - 0.5 % Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2, 3, 4
Prati e pascoli	Ortica dioica	Concentrazione: 0.25 - 0.3 % Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2, 3, 4
Prati e pascoli	Rovi	Concentrazione: 0.5 % Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2, 3, 4
Superfici non coltivate			
Deposito di terreno vegetale	Cardi perenni	Concentrazione: 0.25 - 0.5 %	1, 2, 4
Deposito di terreno vegetale	Romice comune	Concentrazione: 0.5 - 1 %	1, 2, 4
Deposito di terreno vegetale, Terreno incolto	Rovi	Concentrazione: 0.5 %	1, 2, 4
Deposito di terreno vegetale, Terreno incolto	Ortica dioica	Concentrazione: 0.25 - 0.3 %	1, 2, 4
Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim)	Cardi perenni	Concentrazione: 0.25 - 0.5 %	1, 4, 5
Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim)	Ortica dioica	Concentrazione: 0.25 - 0.3 %	1, 4, 5
Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim)	Rovi	Concentrazione: 0.5 %	1, 4, 5
Terreno incolto	Stoppione	Concentrazione: 0.25 - 0.5 %	1, 2, 4
Superfici per la promozione della biodiversità (SPB) secondo OPD			
Superficie coltiva aperta	Stoppione	Concentrazione: 0.25 - 0.5 %	1, 4, 6
Superficie coltiva aperta	Romice comune	Concentrazione: 0.5 - 1 %	1, 4, 6
Superficie inerbita	Rovi	Concentrazione: 0.5 % Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 3, 4, 6
Superficie inerbita	Stoppione	Concentrazione: 0.25 - 0.5 % Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 3, 4, 6
Superficie inerbita	Romice comune	Concentrazione: 0.5 - 1 % Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 3, 4, 6

Oneri generali / agronomici:

- 1 Attenzione: possibili danni su piante utili e ornamentali! Mantenere una distanza laterale sufficiente dalla rizosfera (la distanza dipende dal tipo di suolo e dalla declività del terreno).
- 2 Trattamento pianta per pianta.
- 3 Termine d'attesa fino al prossimo taglio o pascolo: 3 settimane.
- 5 Conformemente all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim): Soltanto trattamenti pianta per pianta su piante problematiche, che non possono essere combattute efficacemente con altre misure.
- 6 Per il trattamento pianta per pianta secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 4 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + una maschera di protezione per le vie respiratorie (A2) + occhiali di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frasi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
- SPe 2 Onde proteggere le acque sotterranee evitare i trattamenti nelle zone di protezione delle acque sotterranee (S2 e Sh).