



Foglio illustrativo n. 7732 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi:	22.52 % Picoxistrobina (250 g/l)
Denominazione IUPAC:	methyl (E)-3-methoxy-2-[2-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxymethyl]phenyl]acrylate
Tenore COV:	0 %

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Acanto

Numero di omologazione federale: D-5216	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: PI 024658-00/001	Titolare dell'autorizzazione estera: Star Agro Analyse und Handels GmbH, Austria

Autorizzato sino al 31.12.2023

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Colza	Mal dello sclerozio	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 61 - 65 (BBCH).	1
Frumento	Oidio dei cereali	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).	1
Frumento	Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 51 (BBCH).	1
Frumento	Bruciature fogliari (PLS)	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 39 - 51 (BBCH).	1, 2, 3
Frumento, Segale autunnale, Triticale	Ruggine bruna	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH).	1
Frumento, Triticale	Ruggine gialla	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH).	1
Frumento, Triticale	Septoriosi della spiga (S. nodorum)	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 51 - 61 (BBCH).	1
Orzo	Macchie reticolate dell'orzo, Oidio dei cereali, Rincosporiosi, Ruggine nana dell'orzo	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 31-51 (BBCH).	1
Segale autunnale, Triticale	Rincosporiosi, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Stadi 37 - 51 (BBCH).	1

Oneri generali / agronomici:

- 1 Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- 2 In combinazione con 1 - 1.5 l/ha Chlorothalonil (40% SC).
- 3 PLS = Physiological Leaf Spots

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**Frase PF**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.