



Foglio illustrativo n. 8452 / 2022

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Prodotto per la concia delle sementi, Fungicida
Formulazione:	SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi:	26.5 % Fluxapyroxade (300 g/l)
Denominazione IUPAC:	3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluorobiphenyl-2-yl)pyrazole-4-carboxamide

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Sercadis

Numero di omologazione federale: A-6473	Paese di provenienza: Austria
Numero di omologazione estero: 3796-0	Titolare dell'autorizzazione estera: BASF SE, Germania

Sercadis

Numero di omologazione federale: D-6939	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 008004-00	Titolare dell'autorizzazione estera: BASF SE, Germania

Fluxapyroxad

Numero di omologazione federale: D-7088	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 008004-00/003	Titolare dell'autorizzazione estera: Agrimotion S. A., Polonia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Frutticoltura			
Frutta a granelli	Oidio della mela/pera	Concentrazione: 0.013 % Dosaggio: 0.21 l/ha Termine d'attesa: 5 Settimane Applicazione: Stadi 53-81 (BBCH).	1, 2, 3, 4
Frutta a granelli	Ticchiolatura della frutta a granelli	Concentrazione: 0.013 % Dosaggio: 0.21 l/ha Termine d'attesa: 5 Settimane Applicazione: Stadi 53-81 (BBCH).	1, 2, 3, 4, 5
Pesce/pesce noce	Oidio della frutta a nocciolo	Concentrazione: 0.009 % Dosaggio: 0.15 l/ha Termine d'attesa: 21 Giorni Applicazione: Stadi 53-81 (BBCH).	1, 2, 3, 4, 6

Viticultura

Vite	Oidio della vite Efficacia parziale: Marciume nero	Concentrazione: 0.0095 % Dosaggio: 0.15 l/ha Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto.	3, 4, 7, 8
------	--	--	------------

Campicoltura

Patate	Rizottonia	Dosaggio: 0.8 l/ha	3, 9
Patate	Rizottonia	Dosaggio: 200 ml/t di patate	3, 10

Oneri generali / agronomici:

- 1 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 2 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 4 SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenze, effettuare al massimo 3 trattamenti per anno e particella con prodotti contenenti principi attivi del gruppo dei SDHI.
- 5 Soltanto in combinazione con 0.03% Delan WG o 0.1% Captan (80%).
- 6 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
- 7 Anche per applicazione per via aerea.
- 8 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m²/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 9 Trattamento del solco.
- 10 Concia con polverizzatore dopo la cernita o durante la semina.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.