



Foglio illustrativo n. 7697 / 2025

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	EC concentrato emulsionato
Tenore di principi attivi:	6.3 % Fenossaprop-P-etile (64 g/l); 0.79 % Iodosulfuron-metile-sodio (8 g/l); Safener: 2.38 % Mefenpir-dietile (24 g/l)
Denominazione IUPAC:	(R)-2-[4-(6-chloro-2-benzoxazol-2-yloxy)phenoxy]propionate; methyl 4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,2,5-triazin-2-yl)ureidosulfonyl]benzoate, sodium salt; diethyl (RS)-1-(2,4-dichlorophenyl)-5-methyl-2-pyrazoline-3,5-dicarboxylate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Hussar Pro

Numero di omologazione federale: F-6491	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 2100235	Titolare dell'autorizzazione estera: Bayer SAS, Francia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Frumento, Orzo	Dicotiledoni (malerbe), Monocotiledoni (malerbe)	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Primavera, in post-emergenza.	1, 2, 3, 4, 5, 6
Frumento, Segale, Spelta, Triticale	Dicotiledoni (malerbe), Monocotiledoni (malerbe)	Dosaggio: 1.25 l/ha Applicazione: Primavera, in post-emergenza.	2, 3, 5, 6, 7, 8
Graminacee per la produzione di sementi	Dicotiledoni (malerbe), Monocotiledoni (malerbe)	Dosaggio: 1 l/ha	1, 2, 5, 6

Oneri generali / agronomici:

- SPE 3: per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- Trattamento in colture seminate in primavera.

- 5 Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 7 Trattamento in colture seminate in autunno.
- 8 SPe 3: per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera.
- 6 Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.