



Foglio illustrativo n. 7772 / 2025

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	OD olio dispersibile
Tenore di principi attivi:	0.75 % mesosulfuron-metil (7.5 g/l); 0.75 % Iodosulfuron-metile-sodio (7.5 g/l); Safener: 2.42 % Mefenpir-dietile (22.5 g/l)
Denominazione IUPAC:	methyl 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-(alpha)-(methanesulfonamido)-p-toluate; methyl 4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,2,5-triazin-2-yl)ureidosulfonyl]benzoate, sodium salt; diethyl (RS)-1-(2,4-dichlorophenyl)-5-methyl-2-pyrazoline-3,5-dicarboxylate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Cossack Pro

Numero di omologazione federale: I-6482	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 015587	Titolare dell'autorizzazione estera: Bayer CropScience S.r.l., Italia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Frumento	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 0.8 - 1 l/ha Applicazione: Stadi 20 - 32 (BBCH). , Primavera, in post-emergenza.	1, 2, 3
Frumento, Segale, Triticale	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1 - 1.2 l/ha Applicazione: Stadi 20 - 32 (BBCH). , Primavera, in post-emergenza.	2, 4, 5

Oneri generali / agronomici:

- 1 SPe 3: per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 3 Trattamento in colture seminate in primavera.
- 4 Trattamento in colture seminate in autunno.
- 5 SPe 3: per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**Frase PF**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.