



Foglio illustrativo n. 8611 / 2020

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi:	49.7 % Aclonifen (600 g/l)
Denominazione IUPAC:	2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Orticoltura			
Aglio, Cipolle [trapiantato], Scalogni [trapiantato]	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: In pre-emergenza.	1, 2, 3, 4, 5, 6
Carote	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 80 Giorni Applicazione: In pre-emergenza.	1, 2, 3, 4, 6
Carote	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 2 - 2.5 l/ha Termine d'attesa: 70 Giorni Applicazione: Trattamento frazionato: 1 - 1.5 l/ha in pre-emergenza (immediatamente dopo la semina) più 1.0 l/ha in post-emergenza (BBCH 13).	2, 3, 4, 6, 7
Finocchio dolce [piantato]	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 2 l/ha Termine d'attesa: 70 Giorni Applicazione: Immediatamente prima della piantagione.	2, 4, 6, 7, 8
Finocchio dolce [seminato]	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 2 l/ha Termine d'attesa: 90 Giorni Applicazione: In pre-emergenza fino a 2 giorni dopo la semina.	2, 4, 6, 7, 8
Lenticchia	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: Trattamento frazionato: 2.0 l/ha in pre-emergenza più 1.0 l/ha o 2 x 0.5 l/ha in post-emergenza (dallo stadio 3 foglie allo stadio 9 foglie della coltura).	1, 2, 3, 4, 6, 9
Lenticchia	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: In pre-emergenza.	1, 2, 3, 4, 6, 9

Piselli	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 2 l/ha Applicazione: In pre-emergenza.	2, 4, 6, 7
Piselli	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: In post-emergenza.	2, 4, 6, 10
Sedano da coste, Sedano rapa	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 2 l/ha Termine d'attesa: 90 Giorni Applicazione: ca. 7 giorni dopo la piantagione., Dopo la radicazione della coltura.	2, 4, 6, 7, 8, 9
cece	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 2.5 - 3 l/ha Applicazione: In pre-emergenza.	1, 2, 4, 6, 9
Campicoltura			
Fava, Girasole, Patate, Pisello proteico	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 3 l/ha Applicazione: In pre-emergenza.	1, 4, 6
Pisello proteico	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: In post-emergenza.	4, 6, 10

Oneri generali / agronomichi:

- 1 SPE 3: Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 4 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG.
- 3 La dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato.
- 4 SPE 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 5 Non applicare su suoli sabbiosi.
- 7 SPE 3: Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 3 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG.
- 8 Occorre far riferimento al rischio di clorosi temporanea della foglia nella fase immediatamente successiva al trattamento.
- 9 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
- 10 SPE 3: Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.
- 6 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frasi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.