



Foglio illustrativo n. 7635 / 2023

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	SC sospensione concentrata
Tenore di principi attivi:	18 % Azossistrobina (200 g/l); 11.3 % Difenconazolo (125 g/l)
Denominazione IUPAC:	methyl (E)-2-{2[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate; cis,trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Askon

Numero di omologazione federale: D-5269	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 006902-00	Titolare dell'autorizzazione estera: Syngenta Agro GmbH, Germania

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Orticoltura			
Barbabietola	Cercosporiosi e ramulariosi	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: All'inizio dell'attacco.	1, 2, 3
Carote	Altenariosi delle carote, Oidio delle carote	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane	1, 2, 3
Cavolfiore, Cavoli a testa, Cavoli di Bruxelles, Cavoli fogliacei	Maculatura anulare del cavolo, Marciume da phoma delle crocifere, Oidio delle crocifere, Ruggine bianca	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: All'inizio dell'attacco.	1, 2, 3
Cavolo rapa	Maculatura anulare del cavolo, Marciume da phoma delle crocifere, Oidio delle crocifere, Ruggine bianca	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: All'inizio dell'attacco.	1, 2, 3
Cetrioli	Oidio delle Cucurbitacee	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: All'inizio dell'attacco.	1, 2, 4
Cipolle	Alternariosi (Alternaria porri), Marciume bianco della cipolla, Peronospora della cipolla, Peronospora delle cipolle, Ruggine del porro, Ticchiolatura della cipolla Efficacia parziale: Botrite della cipolla (Botrytis squamosa)	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane	1, 2, 3

Fagioli con baccello	Peronospora del fagiolo	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 7 Giorni Applicazione: All'inizio dell'attacco.	1, 2, 3
Indivia, Insalate cappuccio	Peronospora della lattuga, Rizotonia della lattuga Efficacia parziale: Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: All'inizio dell'attacco.	1, 2, 3
Melanzana	Alternariosi delle solanacee, Oidio delle solanacee	Concentrazione: 0.1 % Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: All'inizio dell'attacco.	1, 2, 4
Meloni	Cladosporiosi delle cucurbitacee, Oidio delle Cucurbitacee	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: All'inizio dell'attacco.	1, 2, 4
Pastinaca, Prezzemolo tuberoso	Alternariosi delle carote, Necrosi fogliare del prezzemolo, Oidio delle carote	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: All'inizio dell'attacco.	1, 2, 3
Peperone	Oidio delle solanacee	Concentrazione: 0.1 % Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: All'inizio dell'attacco.	1, 2, 4
Pieno campo: Asparagi	Bruciatura delle foglie dell'asparago, Marciume grigio (Botrytis cinerea), Ruggine dell'asparago	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Trattamento dopo il raccolto., A titolo preventivo.	1, 2, 3
Pieno campo: Bietola	Cercosporiosi e ramulariosi	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 21 Giorni Applicazione: All'inizio della contaminazione o al riscontro dei primi sintomi.	1, 2, 3, 5, 6
Pieno campo: Cicoria belga	Alternaria spp., Oidio delle Asteracee, ruggini su insalate (Asteraceae) e su cicoria belga	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: A titolo preventivo.	1, 2, 3
Piselli senza baccello	Antracnosi del pisello, Peronospora del pisello	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 7 Giorni Applicazione: All'inizio dell'attacco.	1, 2, 3
Pomodori	Alternariosi delle solanacee, Oidio delle solanacee, Peronospora del pomodoro, Ticchiolatura del pomodoro	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 3 Giorni Applicazione: All'inizio dell'attacco.	1, 2, 4
Porro	Alternariosi (Alternaria porri), Peronospora del porro, Ruggine del porro	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: A titolo preventivo.	1, 2, 3
Sedano	Septoriosi del sedano	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: A titolo preventivo.	1, 2, 3
Specie di cavoli	Maculatura anulare nera del cavolo, Peronospora delle crucifere Efficacia parziale: Marciume grigio (Botrytis cinerea)	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: All'inizio dell'attacco.	1, 2, 3
Zucchine	Alternariosi delle solanacee, Cladosporiosi delle cucurbitacee, Oidio delle Cucurbitacee	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane	1, 2, 4
Campicoltura			
Barbabietole da foraggio e da zucchero	Cercosporiosi e ramulariosi, Oidio delle barbabietole, Ruggine delle barbabietole	Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 7
Girasole	Phoma del girasole, Phomopsis del girasole Efficacia parziale: Mal dello sclerozio	Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: Appena il rigonfiamento delle gemme a fiore tra le giovani foglie è riconoscibile (stadio a stella / BBCH 51).	1, 8, 9
Coltivazione piante ornam.			
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	Maculature fogliari, Monilia dei rami e dei fiori, Oidio (diverse specie) su piante ornamentali, Ruggini su piante ornamentali	Concentrazione: 0.1 %	1, 3, 10, 11
Culture da fiore e piante verdi, Rose	Maculature fogliari, Monilia dei rami e dei fiori, Oidio (diverse specie) su piante ornamentali, Ruggini su piante ornamentali	Concentrazione: 0.1 %	1, 4, 8, 11
Rose	Oidio delle rose, Ticchiolatura della rosa	Concentrazione: 0.1 %	1, 4, 8, 11

Oneri generali / agronomici:

- 2 SPe 1 - Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all'anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo.
- 3 SPe 3: Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.
- 4 SPe 3: Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.
- 5 Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
- 6 Al massimo 1 trattamento per coltura e anno.

- 7 Al massimo 2 trattamenti per coltura.
- 8 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 9 Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- 10 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 11 SPe 1 - Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all'anno per particella senza superare un totale di principio attivo di 500 g di Difenconazolo.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
- SPe 2 Onde proteggere le acque sotterranee evitare i trattamenti nelle zone di protezione delle acque sotterranee (S2 e Sh).