



Foglio illustrativo n. 8422 / 2021

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Erbicida
Formulazione:	ME microemulsione
Tenore di principi attivi:	5.9 % Triclopir (60 g/l) [sotto forma di 8.2 % de triclopyr-triethylammonium (83.7 g/l)]; 2 % Fluroxypyr (20 g/l) [sotto forma di 2.8% di fluroxypyr-meptyl (28.8g/l)]
Denominazione IUPAC:	3,5,6-trichloro-2-pyridyloxyacetic acid; 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Silvanet

Numero di omologazione federale: B-5999
Numero di omologazione estero: 8629P/B

Paese di provenienza: Belgio
Titolare dell'autorizzazione estera: Dow Agrosciences B.V., Belgio

Garlon Flexy

Numero di omologazione federale: F-6876
Numero di omologazione estero: 9800347

Paese di provenienza: Francia
Titolare dell'autorizzazione estera: Corteva Agriscience France S.A.S, Francia

Garlon 2000

Numero di omologazione federale: F-5998
Numero di omologazione estero: 9800347

Paese di provenienza: Francia
Titolare dell'autorizzazione estera: Corteva Agriscience France S.A.S, Francia

Evade

Numero di omologazione federale: I-6465
Numero di omologazione estero: 9422

Paese di provenienza: Italia
Titolare dell'autorizzazione estera: Corteva Agriscience Italia s.r.l., Italia

Garlon EV

Numero di omologazione federale: I-5997
Numero di omologazione estero: 10183

Paese di provenienza: Italia
Titolare dell'autorizzazione estera: Corteva Agriscience Italia s.r.l., Italia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Campicoltura			
Prati e pascoli	Trattamento della ceppaia contro i ricacci	Concentrazione: 30 % Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Spalmare/impregnare i punti di taglio freschi, prevalentemente in autunno.	1, 2, 3, 4, 5, 6
Prati e pascoli	Arbusti, Cardi perenni, Ortica dioica, Rovi, Specie di romice	Concentrazione: 2 % Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Applicazione per irrorazione.	1, 3, 4, 5, 6, 7
Coltivazione piante ornam.			
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	Trattamento della ceppaia contro i ricacci	Concentrazione: 30 % Applicazione: Spalmare/impregnare i punti di taglio freschi, prevalentemente in autunno.	1, 2, 3, 4, 6
Tappeti erbosi e terreni sportivi	Cardi perenni, Ortica dioica, Romice comune, Rovi	Concentrazione: 2 % Applicazione: Applicazione per irrorazione.	1, 3, 4, 6, 7
Superfici non coltivate			
Deposito di terreno vegetale	Cardi perenni, Ortica dioica, Romice comune, Rovi	Concentrazione: 2 % Applicazione: Applicazione per irrorazione.	1, 3, 4, 6, 7
Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim)	Cardi perenni, Ortica dioica, Rovi	Concentrazione: 2 % Applicazione: Applicazione per irrorazione.	1, 3, 4, 6, 7, 8
Terreno incolto	Arbusti, Ortica dioica, Rovi, Stoppione	Concentrazione: 2 % Applicazione: Applicazione per irrorazione.	1, 3, 4, 6, 7
Superfici per la promozione della biodiversità (SPB) secondo OPD			
Superficie coltiva aperta	Romice comune, Stoppione	Concentrazione: 2 % Applicazione: Applicazione per irrorazione.	3, 4, 6, 7, 9
Superficie inerbita	Romice comune, Rovi, Stoppione	Concentrazione: 2 % Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Applicazione per irrorazione.	3, 4, 5, 6, 7, 9

Oneri generali / agronomici:

- 1 Trattamento pianta per pianta.
- 3 Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
- 4 SPE 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti di un dilavamento rispettare una zona tampone non trattata con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri dalle acque superficiali. Le eccezioni sono contemplate nelle istruzioni dell'UFAG.
- 5 Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento.
- 6 Attenzione: possibili danni su piante utili e ornamentali! Mantenere una distanza laterale sufficiente dalla rizosfera (la distanza dipende dal tipo di suolo e dalla declività del terreno).
- 8 Conformemente all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, allegato 2.5), soltanto trattamenti pianta per pianta su piante problematiche su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari, sempre che non possono essere combattute con altre misure.
- 9 Per il trattamento pianta per pianta secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 2 Preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia con il pennello: indossare guanti di protezione + abiti di protezione.
- 7 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frasi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
- SPe 2 Onde proteggere le acque sotterranee evitare i trattamenti nelle zone di protezione delle acque sotterranee (S2 e Sh).