



Foglio illustrativo n. 6922 / 2024

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Erbicida
Formulazione: WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi: 25 % Flazasulfuron
Denominazione IUPAC: 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulfonyl)urea

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Karachi

Numero di omologazione federale: F-6438
Numero di omologazione estero: 2150050
Paese di provenienza: Francia
Titolare dell'autorizzazione estera: HMWC SARL, Francia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Mirtillo	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Equiseti, Monocotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 0.2 kg/ha	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Viticoltura			
Vite	Equiseti	Dosaggio: 0.2 kg/ha Applicazione: Luglio, agosto.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Vite	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 0.08 - 0.2 kg/ha Applicazione: Durante il periodo di vegetazione.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Coltivazione piante ornam.			
Alberi di Natale	Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)	Dosaggio: 0.2 kg/ha	1, 2, 3, 5, 6, 9, 10

Oneri generali / agronomici:

- 2 SPe 3: Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.

- 4 Dal 4° anno di coltura.
- 5 SPe 3: per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 6 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 7 Trattamento dopo la raccolta.
- 8 Con aggiunta di un umidificante secondo le indicazioni della ditta.
- 9 Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
- 10 Prima del germogliamento si può trattare direttamente sulla coltura. Dopo il germogliamento trattare solo tra le file.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Applicazione della poltiglia con vaporizzatore o vaporizzatore a zaino: Indossare indumenti protettivi.
- 3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frase PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.