



Foglio illustrativo n. 7410 / 2020

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi:	50 % Fosetil alluminio (Fosetyl-Al) ; 25 % Folpet ; 4 % Cimoxanil
Denominazione IUPAC:	Aluminium-tris-(O-ethylphosphonat); N-(trichloromethylthio)phthalimide; 1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Valiant flash

Numero di omologazione federale: F-1313	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 9600001	Titolare dell'autorizzazione estera: Bayer CropScience S.A.,Francia

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Viticultura			
Vite	Peronospora della vite Efficacia parziale: Marciume grigio (Botrytis cinerea), Marciume nero, Oidio della vite Effetti secondari: Rossore parassitario	Concentrazione: 0.2 - 0.25 % Dosaggio: 3.2 - 4 kg/ha Termine d'attesa: 28 Giorni Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Oneri generali / agronomici:

- 2 SPe 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.
- 3 Aggiungendo preparati a base di rame vi è il rischio di bruciatura delle foglie. Consultare il titolare dell'autorizzazione.
- 5 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m²/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 6 Anche per applicazione per via aerea.
- 7 La dose più elevata solamente per l'applicazione per via aerea.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.
- 4 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera.
Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.
I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**Frase PF**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.