



Foglio illustrativo n. 6866 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fitoregolatore
Formulazione:	HN concentrato nebbiogeno a caldo
Tenore di principi attivi:	23.4 % Clorprofam (CIPC) (300 g/l)
Denominazione IUPAC:	Isopropyl 3-chlorocarbanilate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Polder 300HN

Numero di omologazione federale: F-3639	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 2000100	Titolare dell'autorizzazione estera: AgriChem B.V., Paesi Bassi

Gro-Stop Fog

Numero di omologazione federale: A-2239	Paese di provenienza: Austria
Numero di omologazione estero: 2818/0	Titolare dell'autorizzazione estera: Luxan B.V., Paesi Bassi

HM Fog

Numero di omologazione federale: F-6425	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 2140058	Titolare dell'autorizzazione estera: BASF France, Francia

STAR Chlorprofam-Nebel

Numero di omologazione federale: D-4624	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: PI 024255-00/003	Titolare dell'autorizzazione estera: Star Agro Analyse und Handels GmbH, Austria

Luxan GRO-STOP FOG

Numero di omologazione federale: D-3608	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 4255-00	Titolare dell'autorizzazione estera: Luxan B.V., Paesi Bassi

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Locali di stoccaggio e di produzione			
Raccolto stoccato	Inibizione della germinazione	Dosaggio: 20 - 60 ml/t di patate Termine d'attesa: 4 Settimane Applicazione: In autunno.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Oneri generali / agronomici:

- 1 Utilizzare soltanto in locali predisposti esclusivamente allo stoccaggio di patate da tavola e di patate da foraggio.
- 2 Autorizzato esclusivamente per il trattamento dei seguenti prodotti: Patate da tavola e da foraggio (non autorizzato per patate per la produzione di tuberi-seme).
- 3 Le patate trattate possono essere consumate, al più presto, 1 mese dopo il trattamento.
- 4 Trattare soltanto tuberi sani e asciutti.
- 5 Mai stoccare unitamente a patate da semina.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 6 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera.
- 7 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.
- 8 Terminata la durata d'azione: Aerare a lungo i locali prima di riaccedervi.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frasi PF

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.