



Foglio illustrativo n. 7480 / 2021

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica: Fungicida
Formulazione: EW emulsione, olio in acqua
Tenore di principi attivi: 5 % Ciflufenamid (51.4 g/l)
Denominazione IUPAC: (Z)-N-[alpha-(cyclopropylmethoxyimino)-2,3-difluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-2-phenyl-acetamide

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi: Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto: Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Cyflufenamid

Numero di omologazione federale: D-6328
Numero di omologazione estero: GP 025609-00/039
Paese di provenienza: Germania
Titolare dell'autorizzazione estera: Bernbeck LLP, Regno Unito

Nissodium

Numero di omologazione federale: F-6673
Numero di omologazione estero: 2090157
Paese di provenienza: Francia
Titolare dell'autorizzazione estera: Nisso Chemical Europe GmbH, Germania

Vegas

Numero di omologazione federale: D-6051
Numero di omologazione estero: 025609-00
Paese di provenienza: Germania
Titolare dell'autorizzazione estera: Nisso Chemical Europe GmbH, Germania

Cyflodium

Numero di omologazione federale: F-6052
Numero di omologazione estero: 2130067
Paese di provenienza: Francia
Titolare dell'autorizzazione estera: Nisso Chemical Europe GmbH, Germania

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Frutticoltura			
Melo, Pero	Oidio della mela/pera	Concentrazione: 0.031 % Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2, 3

Viticoltura

Vite	Oidio della vite	Concentrazione: 0.03 % Dosaggio: 0.48 l/ha Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto.	3, 4, 5, 6
------	------------------	--	------------

Campicoltura

Frumento	Oidio dei cereali	Dosaggio: 0.25 l/ha Applicazione: Stadi 32-61 (BBCH).	3, 7
Orzo	Oidio dei cereali	Dosaggio: 0.25 l/ha Applicazione: Stadi 32 - 51 (BBCH).	3, 7
Segale autunnale	Oidio dei cereali	Dosaggio: 0.25 l/ha Applicazione: Stadi 32-61 (BBCH).	3, 7
Triticale	Oidio dei cereali	Dosaggio: 0.25 l/ha Applicazione: Stadi 32-61 (BBCH).	3, 7

Oneri generali / agronomichi:

- 1 SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo prodotto più di 2 volte per particella e anno.
- 2 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 4 Al massimo 2 trattamenti per anno.
- 5 Anche per applicazione per via aerea.
- 6 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni dell'UFAG.
- 7 Al massimo un 1 trattamento per coltura.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 3 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**Frazi PF**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.