



Foglio illustrativo n. 7294 / 2023

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	EC concentrato emulsionato
Tenore di principi attivi:	26.9 % Bupirimate (250 g/l)
Denominazione IUPAC:	5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl dimethylsulfamate

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Nimrod EC

Numero di omologazione federale: D-7162	Paese di provenienza: Germania
Numero di omologazione estero: 00A281-00	Titolare dell'autorizzazione estera: ADAMA Deutschland GmbH, Germania

Nimrod

Numero di omologazione federale: I-6093	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 002983	Titolare dell'autorizzazione estera: ADAMA Agan Ltd, Israele

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragola	Oidio della fragola	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 1 Settimane	1, 2
Uva spina	Oidio delle varietà di ribes	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 l/ha Termine d'attesa: 2 Settimane	1, 3, 4
Frutticoltura			
Melo	Oidio della mela/pera	Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.8 l/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 5, 6, 7
Coltivazione piante ornam.			
Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	Oidio (diverse specie) su piante ornamentali	Concentrazione: 0.1 %	8, 9, 10, 11
Colture da fiore e piante verdi, Rose	Oidio (diverse specie) su piante ornamentali	Concentrazione: 0.1 %	7, 8, 9, 11

Oneri generali / agronomici:

- 2 La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 3 Al massimo 5 trattamenti a intervalli di 2 settimane.
- 4 La dose indicata si riferisce allo stadio "allegagione (50 - 90% delle infiorescenze hanno frutti visibili)", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 5 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.
- 6 A determinate condizioni può causare una colorazione violacea delle foglie della varietà Idared e la caduta delle foglie di diverse altre varietà.
- 7 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
- 8 SPe 1 - Per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti contenenti Bupirimate più di 3 volte per particella e anno.
- 10 SPe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.
- 9 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
- 11 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:**FraSI PF**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.