



Foglio illustrativo n. 7639 / 2019

Per prodotti fitosanitari giusta l'ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (art. 36, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161).

Proprietà del prodotto

Denominazione specifica:	Fungicida
Formulazione:	WG granulare idrodispersibile
Tenore di principi attivi:	60 % Mancozeb ; 5 % Mandipropamid
Denominazione IUPAC:	manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt; (RS)-2-(4-chlorophenyl)-N-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere immagazzinato nell'imballaggio originale e depositato separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e agenti terapeutici in modo da renderlo inaccessibile a persone non autorizzate.

Smaltimento

Imballaggi:	Pulire a fondo gli imballaggi vuoti e gettarli nell'immondizia.
Residui di prodotto:	Per l'eliminazione di residui di prodotto consegnare l'imballaggio al centro comunale per la raccolta differenziata, al centro di raccolta per rifiuti pericolosi o al punto vendita.

Prodotti commerciali

Pergado MZ Pepite

Numero di omologazione federale: F-6115	Paese di provenienza: Francia
Numero di omologazione estero: 2080099	Titolare dell'autorizzazione estera: Syngenta France SAS, Francia

Pergado MZ

Numero di omologazione federale: I-5313	Paese di provenienza: Italia
Numero di omologazione estero: 13742	Titolare dell'autorizzazione estera: Syngenta Agro GmbH, Germania

Indicazioni autorizzate

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Efficacia	Applicazione nel rispetto di	(*)
Orticoltura			
Baby-Leaf (Asteraceae)	Peronospora della lattuga	Dosaggio: 2.5 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: A partire dal rischio d'infestazione.	1, 2, 3, 4
Cipolle	Alternariosi (Alternaria porri), Cladosporiosi degli ortaggi a bulbo, Marciume bianco della cipolla, Peronospora della cipolla, Peronospora delle cipolle, Ruggine delle Agliacee (Puccinia allii)	Dosaggio: 2.5 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1, 2, 3, 4, 5
Insalate (Asteraceae)	Peronospora della lattuga	Dosaggio: 2.5 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: A partire dal rischio d'infestazione.	1, 2, 3, 4
Rabarbaro	Peronospora del rabarbaro	Dosaggio: 2.5 kg/ha Applicazione: Al più tardi entro fine agosto., Dopo il raccolto., Irrorare.	1, 2, 3, 6

Rucola	Peronospora delle crucifere	Dosaggio: 2.5 kg/ha Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: A partire dal rischio d'infestazione.	1, 2, 3, 4
Campicoltura			
Patate	Alternariosi delle solanacee, Peronospora della patata	Dosaggio: 2.5 kg/ha Termine d'attesa: 2 Settimane Applicazione: A partire dal rischio d'infestazione.	7, 8, 9

Oneri generali / agronomici:

- 4 Al massimo 3 trattamenti per anno.
- 5 1° trattamento all'inizio dell'infestazione.
- 6 Al massimo 3 trattamenti per coltura e anno.
- 7 Termine di attesa di 1 settimana per le patate primaticce.
- 8 Trattamenti ad un intervallo di 7 - 10 giorni.

Oneri per la protezione dell'utilizzatore:

- 1 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.
- 2 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
- 3 In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi.
- 9 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Caratterizzazioni di pericolo che devono figurare sull'imballaggio:

Frazi PF

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.